



ACCUEIL MEDICO CHIRURGICAL PEDIATRIQUE

O.Mory

Utilisation de la morphine orale pour les fractures déplacées & les brûlures

Version :
08/08/2001 17:08

Protocole d'utilisation de la Morphine orale

INDICATIONS :

- traumatismes des membres avec déformation et/ou EVA \geq 70 (ou OPS > 6)
- brûlures étendues ou profondes à hospitaliser

CONTRE INDICATIONS :

- âge < 6 mois
- prise préalable de Benzodiazépine ou d'antalgiques de palier II
- insuffisance respiratoire
- traumatisme crânien ou abdominal associé
- trouble de conscience
- hypertension intracrânienne HIC
- insuffisance hépatocellulaire
- hypovolémie
- fracture du fémur → plutôt bloc fémoral, ou morphine IV

Nb : la mise à jeun en vue d'une anesthésie n'est pas une contre indication à la morphine orale

EVALUATION DE LA DOULEUR :

Enfant > 5 ans : EVA gradué de 0 à 100

Enfant < 5 ans : OPS gradué de 0 à 8 (sans l'item mesure de la TA)

MORPHINE ORALE 5mg/ml Sirop Aguettant®

Prescription faite par le Médecin Senior après information des parents et de l'enfant

Ecrire en toute lettre sur la fiche de prescription prévue

Après vérification de l'absence de contre indications

Posologie : 0,2 à 0,5 mg/kg de poids

Après administration → Surveillance permanente par les parents / accompagnants de l'absence de somnolence

→ Surveillance par l'infirmière référente s'effectue toutes les 30 minutes et à la sortie du service quelque soit la durée du séjour aux urgences.

Elle comporte :

- évaluation de la douleur avec les échelles déjà utilisées pour l'enfant
- recherche d'effets secondaires :
 - nausées, vomissements, prurit
 - somnolence : S0 : réveillé
 - S1 : réveillable par stimulation verbale
 - S2 : réveillable par stimulation tactile
 - S3 : non réveillable
- fréquence respiratoire :
 - < 1 an : >20
 - 2-5 ans : >15
 - > 5 ans : >12

La surveillance est poursuivie 2 heures aux Urgences si l'enfant n'est hospitalisé

Antidote → NARCAN® 5 à 10 γ /kg, durée : 30 à 45 min.

- Ampoule diluée dans 10 ml de sérum phy prête à l'emploi
- à débiter en systématique si enfant coté S3, ml par ml jusqu'à obtenir une fréquence respiratoire normale
- PS : durée d'action de la morphine orale : 4 heures,